



2021年7月発行  
学校法人織田学園  
おだ認定こども園

感染症情報は、随時『連絡アプリ』  
でお知らせしています。

- 毎月0歳児健診の日は、園長・主幹教諭・栄養士・看護師と、産業医の渡辺医師で、安全衛生会議を行っています。新型コロナ対応の助言では『変異型の流行が油断できないため、大人は熱中症に注意しながら、飛沫予防のためマスクの着用が推奨されます。子どもはワクチンを打てずマスクも上手にできないので、大人の対策で守りましょう』とお話がありました。園児は熱中症のリスクを考え、保育中のマスク着用を見合わせています。家庭内感染が多い傾向は続いていますので、引き続き毎朝の健康観察をお願いします。
- 家族が新型コロナのワクチン接種後発熱した時は？：体に抗体ができる前のため、副反応か感染かの判断ができません。地域の小学校の対応同様、家族が発熱している間は、お子さんはお休みをお願いします。
- 最近は大人だけでなく、子どもの発熱時にPCR検査をする病院もあります。園への連絡や、結果が出るまでの自宅体調観察にご協力ありがとうございます。これまでにご提供している結果は、すべて陰性です。
- 6月感染症等：診断名のつかない発熱・鼻水・咳、胃腸炎、結膜炎、中耳炎、とびひ、水いぼ

## ●『夏かせ』油断しないで！

「夏かせ」は夏に流行する感染症の初期症状の総称です。主にウィルスが原因で、抗生物質や解熱剤では治りません。特に結膜炎や発疹を伴う発熱の場合の多くは、医師の指示に従った療養が必要になります。受診の際は、再受診の目安を医師に確認しておきましょう。

きょうだいや保護者が発熱している時は、家庭内感染の可能性を考えて、登園をひかえるようにして下さい。

### ●手足口病

手の平、足の裏、口の中に水ぼうがで、発熱する事もあります。口の中に痛みがある間は、飲み込みやすい食事にします。

登園は…熱がなく普段の食事ができるようになってから



### ●ヘルパンギーナ

突然の高熱と喉の痛み、口の中の水ぼう、口内炎が特徴です。症状が軽い時は、1～4日位で解熱します。

登園は…熱がなく普段の食事ができるようになってから

## 感染症♡予防接種ナビ®

### ●フル熱(咽頭結膜熱)、流行性角結膜炎(同じアデノウィルス感染症)

3～5日位の高熱、喉の痛み、目の充血・かゆみ・目やに等結膜炎症状、下痢等の症状があります。感染力が強く、家庭でもタオルなどの共用は避けます。ドアノブなどよく触る場所の消毒は、新型コロナと同じアルコールが効果があります。

登園は…

症状がなくなり2日経過し、  
医師の許可が出てから



### ●溶連菌感染症

潜伏期間2～5日。伝染性膿痂疹(とびひ)では7～10日。発熱・のどの痛み・発疹があります。細菌感染のため、抗菌薬内服で効果があります。園での内服指示がある場合は、手続きがありますので、登園前にご連絡ください。

登園は…抗菌薬の内服後 24～48時間  
が経過していること。



## プール・水遊びの健康チェック



- \*こまめに手・足の爪を切りましょう。子どもの爪は伸びるのが早く、思わぬけがの原因になります。
- \*お子さんの髪や肌の状態をチェックしましょう。水いぼやアタマジラミは、早期発見が肝心です！

### ●こんな時はプールに入れません●

- ・前日～当日、37.5℃以上の熱がある
- ・咳がひどい、のどに痛みがある
- ・下痢・腹痛の症状がある
- ・目が赤く充血している。目やにが多い
- ・とびひなど、皮膚に傷がある時は治るまで
- ・朝食を食べない、食欲がない時
- ・上記以外でも『いつもと違う』と感じる時



## ●虫よけをつけて登園を！

虫よけは、毎朝ご家庭から、肌に合う物をつけて登園して下さい。年長組の園外保育等、特別に対策が必要な場合は、学年よりお知らせがあります。



東京都健康安全センター  
『感染症予防』  
「虫よけ」

### ●選ぶポイントは「安全性」



リング型・輪ゴム型の虫よけはにおいが強く、多くは『雑貨』と表示されています。蚊に効果がないだけでなく、子どもが口に入れるなどの危険もあります。安全を第一に考え、園での使用はおやめください。